

### 肝癰治療法

肝癰，即肝臟之膿瘍，多由細菌感染所致。其症狀為右上腹疼痛、發熱、嘔吐、黃疸等。治療方法如下：

一、初期：以休息、禁食、注射抗生素為主。如症狀加重，應考慮手術。

二、手術：將膿瘍切開，清除膿液，並放置引流管。術後需繼續服用抗生素，並注意營養。

三、護理：保持傷口清潔，定期換藥。患者應多休息，避免劇烈運動。

### 中國傷科大全

著者：張伯倫

內容豐富，包括各種傷科病症的診斷與治療方法。全書共分十卷，每卷均有詳細圖解，方便讀者理解。

定價：每部大洋五元。各大藥房均有代售。

**楊志一** 醫師  
地址：上海南京路  
診治：內科、外科、婦科、兒科

**朱振聲** 醫師  
地址：上海南京路  
診治：內科、外科、婦科、兒科

## 幸福報

本報宗旨：報導事實，服務社會。地址：上海南京路。電話：二二二二。

訂閱信息：每月大洋一元，半年六元，全年十二元。外埠另加郵費。

### 煤氣中毒之預防法

煤氣中毒是冬季常見事故，預防方法如下：

一、檢查煤氣設備：確保煤氣灶、暖氣片等設備完好，無漏氣現象。

二、保持通風：使用煤氣設備時，應保持室內空氣流通，避免煤氣聚集。

三、安裝報警器：在煤氣使用區域安裝報警器，一旦發生漏氣，能及時發出警報。

### 愛情障礙

愛情障礙是指因心理因素導致的情感交流障礙。常見原因包括自卑、猜忌、溝通不良等。治療方法如下：

一、心理諮詢：尋求專業心理師的幫助，分析問題根源。

二、溝通技巧：學習有效溝通技巧，增進彼此了解。

三、自我調整：調整心態，建立自信，學會包容與理解。



章太炎著

探口。懸絕如此。此又不可捫  
量而可也。按。此中醫脈學。  
極爲可靠之證明。○若夫奔瀉  
肛腫。勢爲熾矣。腸痔並發。  
魄門如烙。而此處不與同進者  
。其數更難枚數矣。余謂人之  
經脈。如流水然。激下流以如  
湍。上流固受其激也。然故亦  
淡矣。激上流以爲瀦。其下亦  
然。人之外腎。則攝絡也。稍  
入則臍也。此二者次第與邪相  
拒。於是發熱。手足及顙。諸  
大經脈之增熱。未如外腎之甚

也。微脈之增熱。又不如諸大經脈之甚也。轉增轉甚。其裡之熱始劇矣。內熱外透。表亦發熱。諸大經脈之外增熱。必不如衛脈之甚也。外營之增熱。必不爲諸大經脈之甚也。轉增轉甚。其表之熱亦漸劇矣。亦有始終發熱。而裡熱甚微者。以診脈、辨證、探口、按身、相參。得其同異。若一以探口爲據。則所失多矣。

口肺癆淺說(二)

(張又良)

可能。

(七)由於風寒者 風寒侵襲於肺，於治療。或誤與清補。

肺勞原因之一也。

(八)由於燥熱者 燥熱之邪。最易轉成肺勞。

肺勞之病狀 肺勞之病原

致其呼出之氣。若有壅成肺勞之  
 於肺。肺氣不宜。致成咳嗽。失  
 每致邪氣留戀。釀成鬱菌。此亦  
 。使現於肺。肺氣不清。成爲痰

之診斷。尤須詳斷。俾病者知

分述三期於下。

第一期 面色蒼白。兩眼微  
氣短。食量減少。精神抑鬱  
寐。夜有潮熱。

第二期 骨蒸內熱。自汗盜  
瘦削。皮膚枯槁。咳嗽劇烈  
喉疼痛。

(未完)

青年一	切疾苦	之慈航	青年男	女慾海	之明燈
本	內	容	略	畢	莊
△夢遺外	△遺精避	△滑精特	△手淫防	△早泄求	△陽痿目
△脫陽急	△夾陰傷				

方	法	法	法	方	法	法	法
橫莖內消法	△下疳特效藥	△防免白濁法	△女子夢交方	△久帶必止方	△久濁除根方	△急性白濁方	△五淋辨治法
遺尿經驗法	△龍球實驗法	△玉莖療效	△性慾調劑	△楊梅遺毒	△楊梅瘡毒	△毒性喉痹	△楊梅結毒
						△魚口便毒	

少年初生術	正續	上海
精清種子方	兩集	三眼
可靠避孕術	每集	路
天然美容法	定價	辛
必理美容法	八角	報
疝氣簡効方	特價	發行
少年耳聾方	五角	
靈效霍亂方		



**食物消化之**  
 胆汁之胆汁。胆之苦汁。肝之口由食管、黃門而入胃。胃、胃、夫胃之四週。小孔甚多。有通於此時胆中之苦汁。肝中之胃之下口。(即幽門)融和氣養化之。使胃中穀食。似

濃粥後。(未經純粹消

。與手少陰心經爲表裏。小

出。下行達於油膜。有微絲  
由胃連小腸。未化盡者。再  
之消化。再由油膜上循肝系而入心  
之消化。再次即入大腸。  
消化器之第四部 凡食物經  
大腸上橫兩迴時。猶有液管  
液竭盡。但存渣滓。賴肺氣

之下降。始由肛門而出

楊志一編

一 飲食療法 每早宜飲牛乳一盤。與牛乳煮雞蛋二個（若病人以豆腐漿一大盤代之）。八點鐘早餐。宜食粥。粥菜宜考究。案牛乳其性溫和。而富於滋養料。為病弱者每日必需之品。然頑固而殺生人也。每謂牛乳之性極寒。苦勸病人不飲。是無異助結十二點鐘午餐。宜用極豐富之飯菜。若魚。若肉。若鷄鴨。若炒蛋。若各種新鮮蔬菜等。皆不可少。各物宜煮之極爛。煮旺之法宜精。且宜日變換式樣。不可使病人望而生厭。是為至要。然頑固之醫生。往往禁病人食肉食鷄鴨等滋養品。以為補病短人之生命。午後四點鐘宜飲牛乳一大杯。若內地無牛乳。用各種代乳粉亦可。宜以六點鐘晚餐。飯菜比午餐更須豐富。凡病人所食之飯菜。宜以小盆子盛之。每飯每碗少許。如喜吃某種。吃完後儘可再添。萬不可每碗多置於碗內。使殘餘之食品。棄之則可惜。食之則他人有傳染之虞。九點鐘再飲牛乳一大杯。或代乳粉。飲完後即宜安睡。凡烟酒濃醃等有刺激性之食物。皆宜禁絕。

吐血遺精

補肺養陰膠。爲治癆聖藥。立止吐血遺精。補肺都價調。平喘利咳。每瓶一元半。三馬路外路東通藏公司代售。外埠加一。郵票九五。寄滬城吉園街一〇七號潘心伊製藥公司。函索仿單。附郵卽寄。